

DGS-Urgent 2009-INF-14

Mises au point sur la vaccination contre le pneumocoque

Dans le cadre de la préparation à la pandémie de grippe A/H1N1v, l'importance de la vaccination anti pneumococcique de certaines populations spécifiques, recommandée par le Haut conseil de la santé publique, a été rappelée aux médecins généralistes et pédiatres dans un courrier transmis par la CNAMTS durant l'été. Aujourd'hui, une augmentation très forte des ventes de vaccin pneumococcique PNEUMO 23® est constatée, entraînant des difficultés transitoires d'approvisionnement.

Dans ce contexte, il importe de rappeler les caractéristiques des deux types de vaccin pneumococcique existants et les populations spécifiques auxquelles ils sont recommandés.

A ce jour, les deux vaccins pneumococciques disponibles en France sont : PNEUMO 23®, vaccin polysidique 23-valent et PREVENAR®, vaccin pneumococcique conjugué heptavalent.

PNEUMO23® est recommandé pour la vaccination des adultes et enfants à partir de 5 ans, à haut risque d'infection à pneumocoque, cette vaccination devant être renouvelée tous les cinq ans (Cf. chapitre 2.11 du calendrier vaccinal 2009 disponible sur le site <http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-2.pdf> et sur le site <http://www.invs.sante.fr>). Pendant la période transitoire d'approvisionnement limité en PNEUMO 23, jusqu'à fin 2009, il importe de réserver les doses de vaccins disponibles à ces patients.

Par ailleurs, PREVENAR® est recommandé chez tous les enfants de moins de 2 ans. Ce vaccin contient des sérotypes spécifiques aux infections pédiatriques à pneumocoques et n'est pas adapté aux adultes et enfants de plus de 5 ans.