

4.3 Tableau des calendriers vaccinaux obligatoires et recommandés en 2025 en Guyane, à Mayotte, en Réunion et aux Antilles, chez les enfants en population générale

Âges	Calendrier vaccinal en Guyane	Calendrier vaccinal à Mayotte	Calendrier vaccinal en Réunion	Calendrier vaccinal aux Antilles
Naissance	BCG, HepB ⁽¹⁾	BCG, HepB ⁽¹⁾		
2 mois	DTCaPolioHib-HBV PnC ⁽¹⁾ Rotavirus ⁽¹⁾	DTCaPolioHib-HBV PnC ⁽¹⁾ Rotavirus ⁽¹⁾	DTCaPolioHib-HBV PnC ⁽¹⁾ Rotavirus ⁽¹⁾	DTCaPolioHib-HBV PnC ⁽¹⁾ Rotavirus ⁽¹⁾
3 mois	Méningocoque B ⁽¹⁾ Rotavirus ⁽²⁾	Méningocoque B ⁽¹⁾ Rotavirus ⁽²⁾	Méningocoque B ⁽¹⁾ Rotavirus ⁽²⁾	Méningocoque B ⁽¹⁾ Rotavirus ⁽²⁾
4 mois	DTCaPolioHib-HBV PnC ⁽²⁾ +/- Rotavirus ⁽³⁾	DTCaPolioHib-HBV PnC ⁽²⁾ +/- Rotavirus ⁽³⁾	DTCaPolioHib-HBV PnC ⁽²⁾ +/- Rotavirus ⁽³⁾	DTCaPolioHib-HBV PnC ⁽²⁾ +/- Rotavirus ⁽³⁾
5 mois	Méningocoque B ⁽²⁾	Méningocoque B ⁽²⁾	Méningocoque B ⁽²⁾	Méningocoque B ⁽²⁾
6 mois	Méningocoque ACWY	Méningocoque ACWY	Méningocoque ACWY	Méningocoque ACWY
11 mois	DTCaPolioHib (rappel), HepB (rappel) PnC (rappel)	DTCaPolioHib (rappel), HepB (rappel) PnC (rappel)	DTCaPolioHib-HBV (rappel), PnC rappel	DTCaPolioHib-HBV (rappel)PnC (rappel)
12 mois	FJ ^{(1)*} , ROR ⁽¹⁾ , Méningocoque ACWY (rappel) Méningocoque B (rappel)	ROR ⁽¹⁾ , Méningocoque ACWY (rappel), Méningocoque B (rappel)	ROR ⁽¹⁾ , Méningocoque ACWY (rappel), Méningocoque B (rappel)	ROR ⁽¹⁾ , Méningocoque ACWY (rappel), Méningocoque B(rappel)
16-18 mois	ROR ⁽²⁾ , FJ ^{(1)*} si non réalisé avant	ROR ⁽²⁾	ROR ⁽²⁾	ROR ⁽²⁾
24 mois	FJ si non réalisé avant			
6 à 16 ans	6 à 10 ans :FJ ⁽²⁾ si vaccination réalisée avant 2 ans 6 à 16 ans : Dengue**** 6 ans : DTCaPolio (rappel) 11 à 12 ans : dTcaPolio 11 à 14 ans : 2 doses HPV espacés de 5 à 13 mois 11 à 14 ans : Méningocoque ACWY	6 à 16 ans : Dengue**** 6 ans : DTCaPolio (rappel) 11 à 12 ans : dTcaPolio 11 à 14 ans : 2 doses HPV espacés de 5 à 13 mois 11 à 14 ans : Méningocoque ACWY	6 à 16 ans : Dengue**** 6 ans : DTCaPolio (rappel) 11 à 12 ans : dTcaPolio 11 à 14 ans : 2 doses HPV espacés de 5 à 13 mois 11 à 14 ans : Méningocoque ACWY	6 à 16 ans : Dengue**** 6 ans : DTCaPolio (rappel) 11 et 12 ans : dTcaPolio 11 à 14 ans : 2 doses HPV espacés de 5 à 13 mois 11 à 14 ans : Méningocoque ACWY

(1) : 1^{ère} dose

(2) : 2^{ème} dose

(3) : 3^{ème} dose si Rotateq utilisé.

- DTCaP : vaccin contre diphtérie, tétonos, coqueluche acellaire et poliomyélite

- Hib : vaccin contre *Haemophilus influenzae* de type b

- HepB : vaccin contre l'hépatite B

- PnC : vaccin polyosidique conjugué 13-valent ou 15-valent contre le pneumocoque

- FJ : vaccin contre la fièvre jaune

- ROR : vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

* Les enfants vaccinés entre 9 mois et avant l'âge de 2 ans bénéficieront d'une seconde dose entre 6 ans et dans un délai maximal de 10 ans.

*** La vaccination contre la grippe saisonnière peut être proposée chaque année à tous les enfants âgés de 2 à 17 ans révolus.

**** Les enfants âgés de 6 à 16 ans dont les parents ou tuteurs légaux sont dans la capacité de produire une preuve documentée d'une infection antérieure à la dengue, pour l'enfant à vacciner