



En l'absence de recommandations nationales, à la suite des échanges sur la liste à propos du départ des groupes de jeunes pour le Brésil à l'occasion des JMJ (23 au 28 juillet 2013), La Société de Médecine des voyages propose la conduite à tenir suivante :

1. Au niveau vaccinal

- Vérifiez la mise à jour des vaccins usuels selon le calendrier en cours
http://www.invs.sante.fr/content/download/62968/248437/version/5/file/BEH_14_15_2013.pdf
 - o DTPCa (tableau 3.8b du BEH calendrier vaccinal 2013 pour les rattrapages)
 - o ROR 2 injections chez toute personne née après 1979.
 - o VHB
- Proposer systématiquement une vaccination contre **l'hépatite A**
- Vaccin méningococcique : la vaccination est souhaitable du fait du regroupement important de personnes. Le méningocoque circulant principalement au Brésil est le méningocoque C. Si vous décidez de vacciner, optez pour un **vaccin tétravalent conjugué ACYW135**, ce choix permettra en plus de répondre à la recommandation française de vaccination contre le méningocoque C entre 1 et 24 ans révolus et protégera contre les autres sérogroupes pouvant être présent dans une population de jeunes venant de tout les continents.
- La prévention vaccinale de **la typhoïde n'est pas nécessaire** voir l'avis du HCSP sur la pénurie du vaccin anti typhoïdique
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/telecharger/hcspa20121012_stocklimityphoide.pdf
- **Grippe**, le vaccin Hémisphère Nord n'est plus disponible, le vaccin utilisé pour la saison 2012-2013 semble adapté aux souches circulant actuellement. http://ais.paho.org/phil/viz/ed_flu.asp
- **Fièvre jaune**, la vaccination n'est pas indiquée pour un séjour limité à Rio mais est recommandée pour les voyageurs envisageant de séjourner en dehors de Rio. Attention aux escales rendant la vaccination obligatoire (Cayenne, Caracas, etc.). Pour les précautions d'emploi, reportez vous à la fiche Stamaril® révisée :
<http://www.medecine-voyages.fr/download.php5?id=285>

2. En ce qui concerne les maladies à transmission vectorielle

- Chimio prophylaxie antipaludique en cas de séjour en Amazonie, y compris à Manaus - voir BEH
http://www.invs.sante.fr/content/download/37147/178511/version/5/file/beh_20_21_2012.pdf
- Protection contre les piqûres de moustiques dans tous les cas, le risque de dengue est important
<http://www.medecine-voyages.fr/publications/flyerppav.pdf>

3. Pour la prévention des maladies à transmission alimentaire vous trouverez une fiche simple sur le site de la SMV <http://www.medecine-voyages.fr/download.php5?id=285>

4. Information des voyageurs sur les risques liés au soleil et à la déshydratation.

5. Selon le programme des groupes le risque rabique (comportements à éviter et conduite à tenir en cas d'exposition) mérite d'être rappelé même si l'on ne recommande pas la vaccination.

6. Les risques liés au comportement sexuel et ceux liés aux accidents doivent enfin, être évoqués comme pour tout rassemblement.